

Hépatite C et psychiatrie : vers un dépistage systématique ?

Foulques ICOLE, Pr. Jean-Pierre BRONOWICKI

INTRODUCTION


La prévalence de l'hépatite C dans la population générale en France est estimée inférieure à 1 %.

Elle serait supérieure dans la population psychiatrique, notamment du fait des conduites à risques addictologiques. Le but de cette étude est donc d'évaluer la prévalence de l'hépatite C dans la population en milieu psychiatrique et de décrire le profil des patients infectés.


MÉTHODE

Il s'agit d'une étude prospective avec inclusion des patients admis à l'unité intersectorielle d'accueil et d'orientation (UIAO) du CHS Ravenel entre le 3 janvier 2020 et le 2 octobre 2020. Un dépistage VHC, VHB et VIH était proposé aux patients hospitalisés. En cas de sérologie positive, une charge virale était alors demandée.

RÉSULTATS



- 407 patients inclus dans l'étude
- 17/407 patients (4,2%) étaient VHC+, 2 anti-VIH+/anti-VHC- et aucun agHBs+
- •14/41 patients (34,1%) bénéficiant d'un traitement de substitution aux opiacés (TSO) avaient un dépistage VHC+
- 16/157 patients (10,2%) ayant déjà fait usage de drogue avaient un dépistage VHC+
- 14/244 hommes VHC+ (5,7%) 3/163 femmes VHC+ (1,8%)



• Genre :

14 hommes pour 3 femmes

Sex-Ratio: 4,7

• Chez 9/17 patients VHC+, l'ARN était détectable, soit 2,2% de la population étudiée

• Score de fibrose FIB4 : ≤ 1,45 : 12/17 patients ≥ 2,40 : 2/17 patients

Score moyen de fibrose : 1,23

Consommation de toxiques :
16/17 en ont déjà consommé
10/17 en consomment actuellement
14/17 patients bénéficient d'un TSO : 8 par buprénorphine et 6 par méthadone

• Trouble usage de l'alcool associé :

3/17 : sans consommation 3/17 : usage simple 10/17 : mésusage

1/17 : sevré

CONCLUSION

Cette étude confirme que la prévalence du VHC (4,2%) est plus élevée dans la population psychiatrique que dans la population générale, avec un ARN détectable chez 2,2% hospitalisés, ce qui justifie la poursuite du dépistage dans cette population. Le principal facteur de risque est, de loin, l'usage de drogue.









