



Université Ibn Tofaïl _ Kenitra
Faculté des Sciences Humaines et Sociales
Le Laboratoire Homme, Société et Valeurs

Poster scientifique au Congrès International d'Addictologie de l'ALBATROS

Mardi 7, Mercredi 8 & Jeudi 9 Juin 2022

Titre du Poster :

Trouble Anxiété Sociale et Poly-addiction : Modèle de Pathologie Duelle

- Étude des cas cliniques au sein du CHU, Hôpital de Psychiatrie Hassan II de Fès ; Maroc -

Réalisé et Présenté par : Pr. Jaouad SAIDI

Psychologue Clinicien et Doctorant Chercheur
en Psychopathologie clinique

Email : jaouad.saidi@uit.ac.ma

Introduction

L'objectif général de cette étude était de déterminer la polyconsommation de substances psychoactives chez les patients psychiatriques phobiques sociaux. Est-ce que le trouble anxiété sociale alimente les addictions aux substances psychoactives ? Est-ce que l'addiction aux substances psychoactives alimente les pathologies psychiatriques y compris le trouble anxiété sociale ?

Patients et méthodes

L'étude décrite repose sur le dépistage de phobiques sociaux ayant des troubles addictives possiblement associées, ces patients ont été choisis adultes (24-54 ans) au sein du CHU-Fès. Nous rapportons quatre cas cliniques ayant de pathologie duelle; trouble anxiété sociale et poly-addictions aux substances psychoactives surtout le cannabis, le tabac et l'alcool. Chaque patient a été diagnostiqué par des psychiatres-addictologues. L'évaluation consiste premièrement l'observation clinique et plusieurs entretiens semi-directifs. Nous avons utilisé l'échelle de LIEBOWITZ et aussi le test diagnostique M.I.N.I. (DSM-IV) pour l'évaluation et le dépistage du trouble anxiété sociale. D'autre part, nous avons utilisé le test de la pathologie addictive (DSM-V). Nous avons aussi utilisé le test CAST pour l'évaluation du degré de l'addiction dans le cadre de la consommation de cannabis, et le test (Fagerström) pour l'évaluation de l'usage problématique du tabac, et finalement nous avons utilisé le test AUDIT pour la détection d'une consommation problématique de l'alcool.

Résultats

Cette étude nous a poussé à voir ces personnes phobiques sociaux consommateurs de produits, les résultats de cette comorbidité la plus en vue chez eux par rapport à leur mécanismes, facteurs favorisant la poly-addiction aux substances psychoactives serait la pathologie psychiatrique y compris le trouble anxiété sociale, et l'addiction devient comme le produit de l'interaction entre les précurseurs psychologiques et les processus addictifs.

Conclusion

Cette dualité est mal connue mais en réalité fréquente, amènerait à une multiconsommation pathologique du produit. Globalement, on peut dire que l'importance de porter une attention particulière à la question du double diagnostic, les deux composantes, pour le déploiement de leur prise en charge adaptée.

Liste des mots-clés :

- Pathologie duelle
- Poly-Addiction
- Trouble Anxiété Sociale (Phobie sociale)

Numéro : 37

Orateur : JAOUAD SAIDI

Structure : Résumé

Thème : Addictions

- Mode de présentation souhaitée :
A l'appréciation du Comité Scientifique
- Accord de publication :
Selon la politique de confidentialité des données
- Mis à jour le : Vendredi 27 Mai 2022 10:30