

# Prévalence des conduites addictives chez les patients hospitalisés en services psychiatrique de l'EPSM de Guadeloupe

Salomé-Marie Montantin M.D<sup>1</sup>, Jean-Marc Jérémie M.D.<sup>2</sup>, Angerville Bernard M.D, PhD<sup>3,4,5</sup>

1. Université des Antilles, Faculté de médecine
2. Service G02, EPSM de Guadeloupe, Saint-Claude, Guadeloupe
3. Service d'addictologie, EPSM de Guadeloupe, Saint-Claude, Guadeloupe
4. INSERM U1299 Trajectoires développementales en Psychiatrie et addictologie. École normale supérieure, Centre Borelli, Université Paris Saclay.
5. UR PSYCOMADD-Université Paris Saclay

Auteur correspondant : Dr Angerville Bernard  
[bernardangerville@gmail.com](mailto:bernardangerville@gmail.com)

## Introduction

Les problématiques de consommation dans les services d'hospitalisation en psychiatrie entravent le cadre et le pronostic des soins. Peu d'études portent sur les prévalences des conduites addictives en cours d'hospitalisation chez les patients au sein d'un établissement public de santé mentale. L'objectif principal de cette étude est de déterminer la prévalence des conduites addictives chez les patients hospitalisés au sein des services adultes de psychiatrie de l'EPSM de la Guadeloupe et d'explorer les facteurs socio-démographiques associés.

## Matériel et méthodes

Une étude monocentrique, transversale et descriptive a été réalisée impliquant 7 services intrahospitaliers de psychiatrie adulte de l'EPSM-Guadeloupe. Grace à un recueil de données issu du Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information (PMSI) et l'analyse des dossiers. Les patients âgés de plus de 18 ans hospitalisés au sein des 7 services intra-hospitaliers de psychiatrie adulte de l'EPSM-G durant une période d'un mois ont été inclus.

## Résultats et conclusions

113 patients ont été inclus dans cette étude. 63.9% des patients inclus présentaient un trouble psychotique. La moyenne d'âge de l'échantillon est de 45,6 ans (+/- 14,4) dont 66 patients sont des hommes (58,4%). Une prévalence de conduites addictives de 45,1% a été retrouvée dans l'échantillon des patients inclus. Parmi ces patients présentant des conduites addictives avec substances, 31% consomment 2 toxiques ou plus. Le taux de codage diagnostique CIM dans le DPI, des conduites addictives chez ces usagers s'est élevé à 31,4%. Les conduites addictives étaient significativement plus fréquentes chez les hommes jeunes, notamment la consommation de crack. Par rapport aux études de cohorte internationales, on remarque un sous diagnostic et un sous dépistage des consommations chez les patients hospitalisés sur les structures de soins psychiatriques. Enfin, elle suggère la poursuite de recherches autour des représentations sociales des conduites addictives chez les soignants en psychiatrie.

**Mots clés :** conduites addictives - troubles psychiatriques - pathologies duelles - EPSM de la Guadeloupe